

EXPERTS  
FOR GROWTH



Περιγραφικός Κατάλογος

COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Αιγιαλείας 54,  
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ,  
Τηλ. 211 1769 100,  
FAX 211 1769 150

[www.compo-expert.gr](http://www.compo-expert.gr)  
[compohellas@compo.com](mailto:compohellas@compo.com)

EXPERTS FOR GROWTH



SCAN TO FIND OUR WEBSITE



# Compo Expert Hellas Application

Ένα Απαραίτητο Εργαλείο για τον Αγρότη  
και το Γεωτεχνικό.

Η νέα πρωτοποριακή εφαρμογή της Compo Expert Hellas σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πλήθος πληροφοριών που αφορούν τις αγροτικές σας δραστηριότητες: Τεχνικά φυλλάδια και προτάσεις λίπανσης των κυριότερων καλλιεργειών, πρόγνωση καιρού για την περιοχή σας (πηγή: [www.meteo.gr](http://www.meteo.gr)), γεωργικές προειδοποιήσεις ανά περιοχή και ανά καλλιέργεια (πηγή: [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)), διεθνείς τιμές για βαμβάκι, καλαμπόκι, ρύζι, σιτάρι και επίκαιρα αγροτικά νέα (πηγή: [www.agronews.gr](http://www.agronews.gr)) κ.α.



Προδιαγραφές κινητού τηλεφώνου

Λειτουργικό Android 2.2 (και άνω) 240x320 , 320x480, 480x800 tablets 7" και 10".  
Οι συσκευές τηλεφώνου πρέπει να υποστηρίζουν Open GLES version 2  
και να υπάρχουν διαθέσιμα στην κάρτα SD τουλάχιστον 10MB.

Κατεβάστε το ΔΩΡΕΑΝ





# Complesal®

## Κοκκώδη Λιπάσματα

Τα γνωστά σε όλους λιπάσματα Complesal®, διακρίνονται από τις ιδανικές αναλογίες των θρεπτικών μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων, με σύσταση ίδια σε κάθε κόκκο. Έτσι μέσα στη νέα εντυπωσιακή και προσεγμένη διαφανή συσκευασία, υπάρχει ένα προϊόν με ιδανική σχέση μεταξύ του αμμωνιακού και νιτρικού αζώτου, με το κάλιο και το μαγνήσιο να προέρχονται αποκλειστικά από θειικό άλας και ο φώσφορος κυρίως από φωσφορικό οξύ. Επίσης στο προϊόν περιέχονται και τα βασικότερα ιχνοστοιχεία όπως σίδηρος, βόριο και ψευδάργυρος σε αφομοιώσιμες από τα φυτά μορφές.

Το Complesal® χαρακτηρίζεται από:

- Υψηλή αφομοιωσιμότητα και υψηλή διαλυτότητα,
- Πολύ καλή κοκκομετρία και χρωματισμό με το χαρακτηριστικό για το complesal μπλέ, στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό του κόκκου,
- Λιγότερη σκόνη λόγω μείωσης της τριβής μεταξύ των κόκκων,
- Υψηλή αναγνωρισιμότητα και διαφοροποίηση του προϊόντος από τα υποδεέστερα αντίγραφα του.





Κοκκώδη Λιπάσματα

Complesal®

Διαθέσιμοι Τύποι



**Complestal® Supra 12-8-16+3MgO+B,Fe,Zn**

**Σύνθεση:** 12% N (5% νιτρικό και 7% αμμωνιακό), 8% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 6,4%), 16% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%), 10% S (υδατοδιαλυτό 8% )  
Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.

**Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία. Το αυθεντικό γερμανικό Complestal® Supra.**



**Complestal® Suprem 21-5-10+3MgO+B,Fe,Zn**

**Σύνθεση:** 21% N (10% νιτρικό και 11% αμμωνιακό), 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 4%), 10% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%), 6% S (υδατοδιαλυτό 4,8% )  
Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,3% Fe, 0,02% Zn.

**Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία και λιγότερο σε φώσφορο.**



**Complestal® N-Max 24-5-5+2MgO+B,Fe,Zn**

**Σύνθεση:** 24% N (11% νιτρικό και 13% αμμωνιακό), 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 4%), 5% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,6%), 5% S (υδατοδιαλυτό 4% )  
Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.

**Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.**



**Complestal® olea+ 20-5-10+2+0,3B+Fe+Zn**

**Σύνθεση:** 20 % N Ολικό Άζωτο (10,5% αμμωνιακό, 9,5% νιτρικό), 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 3%), 10% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,6%), 5% S (υδατοδιαλυτό 4% )  
Ιχνοστοιχεία: 0,3% B (υδατοδιαλυτό 0,25%), 0,1% Fe, 0,01% Zn.

**Ιδανικό για καλλιέργειες απαιτητικές σε Βόριο, καλύπτοντας συγχρόνως και όλες τις άλλες ανάγκες σε μικρο και μακρο στοιχεία.**

EXPERTS  
FOR GROWTH



# Blaukorn®

Κοκκώδη Λιπάσματα

Τα παγκοσμίως γνωστά λιπάσματα Blaukorn®, διακρίνονται από τις ιδανικές αναλογίες των θρεπτικών μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων, με σύσταση ίδια σε κάθε κόκκο. Έτσι μέσα στη νέα εντυπωσιακή και προσεγμένη διαφανή συσκευασία, υπάρχει ένα προϊόν με ιδανική σχέση μεταξύ του αμμωνιακού και νιτρικού αζώτου, με το κάλιο και το μαγνήσιο να προέρχονται αποκλειστικά από θειϊκό άλας και ο φώσφορος κυρίως από φωσφορικό οξύ.

Επίσης στο προϊόν περιέχονται και τα βασικότερα ιχνοστοιχεία όπως σίδηρος, βόριο και ψευδάργυρος σε αφομοιώσιμες από τα φυτά μορφές.

Το Blaukorn® χαρακτηρίζεται από:

- Υψηλή αφομοιωσιμότητα και υψηλή διαλυτότητα,
- Πολύ καλή κοκκομετρία και χρωματισμό με το χαρακτηριστικό μπλέ χρώμα στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό του κόκκου,
- Λιγότερη σκόνη λόγω μείωσης της τριβής μεταξύ των κόκκων.





Κοκκώδη Λιπάσματα

Blaukorn®

Διαθέσιμοι Τύποι



**Blaukorn® Classic 12-8-16+3MgO+B,Fe,Zn**

**Σύνθεση:** 12% N (5% νιτρικό και 7% αμμωνιακό), 8% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 6,4%), 16% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%), 10% S (υδατοδιαλυτό 8% )  
Ιχνοστοιχεία : 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.

**Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία. Το αυθεντικό γερμανικό Blaukorn® Classic.**



**Blaukorn® Suprem 21-5-10+3MgO+B,Fe,Zn**

**Σύνθεση:** 21% N (10% νιτρικό και 11% αμμωνιακό), 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 4%), 10% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%), 6% S (υδατοδιαλυτό 4,8% )  
Ιχνοστοιχεία : 0,02% B, 0,3% Fe, 0,02% Zn.

**Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία και λιγότερο σε φώσφορο.**



**Blaukorn® N-Max 24-5-5+2MgO+B,Fe,Zn**

**Σύνθεση:** 24% N (11% νιτρικό και 13% αμμωνιακό), 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 4%), 5% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,6%), 5% S (υδατοδιαλυτό 4% )  
Ιχνοστοιχεία : 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.

**Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.**



**Blaukorn® Energy 17-9-13+2MgO + Fe, B, Zn**

**Σύνθεση:** 17% N (7,5% νιτρικό και 9,5% αμμωνιακό), 9% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 7%), 13% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,4%), 6% S (υδατοδιαλυτό 4,5% )  
Ιχνοστοιχεία : 0,3% Fe, 0,02% B, 0,02% Zn.

**Ιδανικό για κάθε καλλιέργεια με αυξημένες απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία.**



**Blaukorn® Triplo 15-9-15+2MgO+B,Fe,Zn**

**Σύνθεση:** 15% N (6,6% νιτρικό και 8,4% αμμωνιακό), 9% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 7,2%), 15% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 2,2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,7%), 7,7% S (υδατοδιαλυτό 6,2% )  
Ιχνοστοιχεία : 0,02% B, 0,02% Fe, 0,01% Zn.

**Ιδανικό για βασικές λιπάνσεις και για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε φώσφορο, κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.**

EXPERTS  
FOR GROWTH



# Novatec®

## Κοκκώδη Λιπάσματα

Τα λιπάσματα NOVATEC® είναι τα γνωστά σε όλους ποιοτικά λιπάσματα COMPLESAL® με την προσθήκη του παρεμποδιστή νιτροποίησης DMPP.

Εδώ λοιπόν συναντώνται οι δύο από τις μεγαλύτερες και αναγνωρίσιμες τεχνολογίες αιχμής της βιομηχανίας των λιπασμάτων. Στο πέρασμα του χρόνου τα σταθεροποιημένα με DMPP λιπάσματα, έγιναν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Έλληνα παραγωγού, τόσο για την βελτίωση ποσοτικά και ποιοτικά της παραγωγής του, όσο και για την ελαχιστοποίηση των απωλειών του αζώτου.





**Novatec® Classic**  
**12-8-16+3MgO+B,Fe,Zn**  
**Σύνθεση:** 12% N (5% νιτρικό και 7% αμμωνιακό), 8% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 6,4%), 16% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%), 10% S (υδατοδιαλυτό 8% )  
 Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.  
**Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία. Το αυθεντικό γερμανικό Complesal® Supra με την προσθήκη DMPP.**



**Novatec® Suprem**  
**21-5-10+3MgO+B,Fe,Zn**  
**Σύνθεση:** 21% N (10% νιτρικό και 11% αμμωνιακό), 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 4%), 10% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%), 6% S (υδατοδιαλυτό 4,8% )  
 Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,3% Fe, 0,02% Zn.  
**Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία και λιγότερο σε φώσφορο.**



**Novatec® N-Max**  
**24-5-5+2MgO+B,Fe,Zn**  
**Σύνθεση:** 24% N (11% νιτρικό και 13% αμμωνιακό), 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 4%), 5% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,6%), 5% S (υδατοδιαλυτό 4% )  
 Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.  
**Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.**



**Novatec® Triplo**  
**15-9-15+2MgO+B,Fe,Zn**  
**Σύνθεση:** 15% N (6,6% νιτρικό και 8,4% αμμωνιακό), 9% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 7,2%), 15% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 2,2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,7%), 7,7% S (υδατοδιαλυτό 6,2% )  
 Ιχνοστοιχεία : 0,02% B, 0,02% Fe, 0,01% Zn.  
**Ιδανικό για βασικές λιπάνσεις και για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε φώσφορο, κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.**



**Novatec® NP 24-10**  
**Σύνθεση:** 24% N (11% νιτρικό και 13% αμμωνιακό), 10% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 8%).  
**Ιδανικό για βασική αλλά και επιφανειακή λίπανση σε όλες τις καλλιέργειες.**



**Novatec® 21 21**  
**Σύνθεση:** 21% N (100% αμμωνιακής μορφής), 24% S (υδατοδιαλυτό).  
**Κοκκώδες αζωτούχο λίπασμα με παρεμποδιστή νιτροποίησης του αζώτου (DMPP), κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.**



**Novatec® 40 40**  
**Σύνθεση:** 40% N (35,8% καρβαμιδικής μορφής, 4,2% αμμωνιακό), 5% S (υδατοδιαλυτό).  
**Υδατοδιαλυτό λίπασμα αζώτου με παρεμποδιστή νιτροποίησης του αζώτου (DMPP), κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.**



**Novatec® 46 46**  
**Σύνθεση:** 46% N καρβαμιδικής μορφής, 100% υδατοδιαλυτό.  
**Υδατοδιαλυτό λίπασμα με παρεμποδιστή νιτροποίησης του αζώτου (DMPP), κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.**

# NovaTec®

Δοκιμασμένη τεχνολογία, τώρα καλύτερη από ποτέ..



## DMPP

Στον τομέα της βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών η COMPO συνεχίζει να βελτιώνει τη σταθεροποίηση τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Έτσι, πλέον η σταθεροποίηση της Compro επιτυγχάνει τα εξής:

A

### > ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ

του DMPP από το λίπασμα με αποτέλεσμα την καλύτερη κάλυψη του κόκκου.

B

### > ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

για ελαχιστοποίηση των απωλειών DMPP λόγω πτητικότητας στο χώρο ωρίμανσης που χρησιμοποιούσαμε ως τώρα.

Γ

### > ΑΜΕΣΗ ΕΝΣΑΚΚΙΣΗ

ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία χώρου και χρόνου σε μία εποχή όπου οι απαιτήσεις των πελατών μας, επιβάλλουν να είμαστε και γρήγοροι και καλύτεροι.


Δ

### > ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ακόμη και με χαμηλότερες δόσεις εφαρμογής.\*

\*Η δράση του εξαρτάται από την θερμοκρασία και την υγρασία.


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ



ΧΩΡΙΣ  
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΗ



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ



ΜΕ  
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΗ

>> Το DMPP προστιθέμενο στα υψηλής ποιότητας σύνθετα λιπάσματα Complezal® και Blaukorn®, παρεμβαίνει στον κύκλο του αζώτου επιβραδύνοντας την διαδικασία της μετατροπής του αμμωνιακού αζώτου σε νιτρικό (νιτροποίηση). Η μείωση των απωλειών του αζώτου (έκπλυση - εξάχνωση), που επιτυγχάνεται μέσω της σταθεροποίησης, εκτός από τα προφανή οικονομικά οφέλη που αποδίδει στον παραγωγό, συνεισφέρει και στη μείωση της επιβάρυνσης του υπεδάφιου υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και των αγροτικών προϊόντων από τα νιτρικά που τόσος λόγος γίνεται τελευταία. Η επίδραση του DMPP, μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και έτσι το διαθέσιμο άζωτο αυξάνεται, όταν οι ανάγκες των φυτών σε άζωτο αυξάνονται. Επίσης, λόγω της ισχυρά όξινης αντίδρασης του μορίου του DMPP, επιτυγχάνεται επίσης μία ελαφρά μείωση της οξύτητας (pH) της ριζόσφαιρας που συνεπάγεται την αύξηση της διαθεσιμότητας των δύσκολα αφομοιώσιμων σε αλκαλικά εδάφη φωσφόρου και ιχνοστοιχείων.



# Enpeka®

## Κοκκώδη Λιπάσματα

- Τα λιπάσματα ENPEKA® είναι τα κλασσικά σύνθετα λιπάσματα τριών στοιχείων με χαρακτηριστικά όπως:
- Ιδανικές αναλογίες των τριών βασικών στοιχείων, με ίδια σύσταση σε κάθε κόκκο,
  - άριστη κοκκομετρία και ομοιομορφία κόκκου,
  - απουσία σκόνης λόγω της ποιότητας του κόκκου,
  - υψηλή αφομοιωσιμότητα λόγω της ποιότητας και της διαλυτότητας των πρώτων υλών.





**ΕΝΡΕΚΑ® 22-7-7+2S**  
**Σύνθεση:** 22% Ν Ολικό Άζωτο (10% νιτρικό και 12% αμμωνιακό), 7% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 4,5%), 7% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό.  
**Ιδανικό για καλλιέργειες με απαιτήσεις σε όλα τα βασικά στοιχεία, αλλά κυρίως στο άζωτο.**



**ΕΝΡΕΚΑ® 15-15-15+5S**  
**Σύνθεση:** 15% Ν Ολικό Άζωτο (6,5% νιτρικό και 8,5% αμμωνιακό), 15% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 10,0%), 15% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό, 5% S (υδατοδιαλυτό 4%).  
**Ιδανικό για καλλιέργειες με απαιτήσεις σε όλα τα βασικά στοιχεία, σε ισοροπημένη αναλογία μεταξύ τους.**



**ΕΝΡΕΚΑ® 22-7-12**  
**Σύνθεση:** 22% Ν Ολικό Άζωτο (10% νιτρικό και 12% αμμωνιακό), 7% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 5%), 12% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό.  
**Ιδανικό για καλλιέργειες με απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία.**



**ΕΝΡΕΚΑ® 27-6-6**  
**Σύνθεση:** 27% Ν Ολικό Άζωτο (12,5% νιτρικό και 14,5% αμμωνιακό), 6% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, (υδατοδιαλυτός 2%), 6% K<sub>2</sub>O υδατοδιαλυτό.  
**Ιδανικό για καλλιέργειες με απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία, αλλά κυρίως στο άζωτο.**



# DuraTec®

## Ημιπερικαλυμμένα Λιπάσματα

Τα DuraTec® είναι νέας τεχνολογίας λιπάσματα που συνδυάζουν τις απλές μορφές νιτρικού και αμμωνιακού με δύο άλλες νέες τεχνολογίες αζώτου. Μεγάλο μέρος του συνολικού αζώτου βρίσκεται σε σταθεροποιημένη αλλά και σε περικαλυμμένη μορφή εξασφαλίζοντας την συνεχή τροφοδοσία της καλλιέργειας κατά την διάρκεια του βιολογικού της κύκλου.





**DuraTec® Top 14 14+7+14+2**  
**Σύνθεση:** 14% συνολικό άζωτο (6% νιτρικό, 8% αμμωνιακό), 7% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (το 5,6% υδατοδιαλυτό), 14% K<sub>2</sub>O (100% υδατοδιαλυτό), 2% MgO (το 1,6% υδατοδιαλυτό), 9% S (το 7,2% υδατοδιαλυτό)  
 Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0.01% Zn.

Σύμμεκτο κοκκώδες ημιπερικαλυμμένο NPK πλήρες λίπασμα που περιέχει σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο και ιχνοστοιχεία. Ισορροπη αναλογία θρεπτικών στοιχείων, κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια κυρίως ως βασική λίπανση.



**DuraTec® Top 21 21+5+9+2**  
**Σύνθεση:** 21% συνολικό άζωτο (9.9% νιτρικό, 11.1% αμμωνιακό), 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (το 4,0% υδατοδιαλυτό), 9% K<sub>2</sub>O (100% υδατοδιαλυτό), 2% MgO (το 1,6% υδατοδιαλυτό), 5.7% S (το 4,6% υδατοδιαλυτό)  
 Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,025% Fe, 0.015% Zn.

Σύμμεκτο κοκκώδες ημιπερικαλυμμένο NPK πλήρες λίπασμα που περιέχει σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο και ιχνοστοιχεία. Πλούσιο σε άζωτο κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια για βασική αλλά και επιφανειακή χρήση.



**DuraTec® Top 24 24-5-5+2**  
**Σύνθεση:** 25% συνολικό άζωτο (11% νιτρικό, 13% αμμωνιακό), 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (το 4% υδατοδιαλυτό), 5% K<sub>2</sub>O, 2% MgO (το 1,6% υδατοδιαλυτό), 5% S (το 4% υδατοδιαλυτό)  
 Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0.01% Zn.

Κοκκώδες ημιπερικαλυμμένο λίπασμα που περιέχει και σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο. Πλούσιο σε άζωτο, κατάλληλο για βασική αλλά και επιφανειακή χρήση.



# Complesal® Solub

## Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα

Υψηλών προδιαγραφών πλήρης γκάμα υδατοδιαλυτών και διαφυλλικών προϊόντων. Ιδανικά για κάθε καλλιέργεια όπως, κηπευτικά, δέντρα, αμπέλι, βαμβάκι, ανθοκομία κ.λ.π. Άριστη θρέψη με τύπους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαφορετικών φάσεων του παραγωγικού κύκλου των καλλιεργειών. Παραγωγή από κορυφαίας ποιότητας πρώτες ύλες με ιχνοστοιχεία σε μορφή EDTA για εγγυημένη απορρόφηση και αξιοποίηση από τα φυτά.





### Complestal® Solub 7-12-40+2+IXN

**Σύνθεση:** 7% νιτρικό άζωτο, 12% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (υδατοδιαλυτός), 40% K<sub>2</sub>O, 2% MgO, 4% S  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Cu\*, 0,05% Fe\*, 0,05% Mn\*, 0,001% Mo, 0,02% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

**Συνίσταται για κάθε καλλιέργεια ειδικά στο στάδιο της καρποφορίας για διόγκωση και ωρίμανση φρούτων και λαχανικών και για αποδόσεις υψηλής ποιότητας.**



### Complestal® Solub 13-40-13 + IXN

**Σύνθεση:** 13% συνολικό άζωτο (8,7% νιτρικό, 4,3% αμμωνιακό), 40% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (υδατοδιαλυτός), 13% K<sub>2</sub>O (υδατοδιαλυτό), 0,4% S  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Cu\*, 0,05% Fe\*, 0,05% Mn\*, 0,001% Mo, 0,02% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

**Ιδανικό για κάθε καλλιέργεια ειδικά για τα αρχικά στάδια για ανάπτυξη της ρίζας και γενικότερα του ριζικού συστήματος.**



### Complestal® Solub 20-5-10+2+IXN

**Σύνθεση:** 20% συνολικό άζωτο (7% νιτρικό και 13% αμμωνιακό) 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (υδατοδιαλυτός), 10% K<sub>2</sub>O, 2% MgO, 10% S  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Cu\*, 0,05% Fe\*, 0,05% Mn\*, 0,001% Mo, 0,02% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

**Προτείνεται για τα πρώτα στάδια κάθε καλλιέργειας γιατί παρέχει αρκετές μονάδες αζώτου και μονάδες από τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία.**



### Complestal® Solub 15-5-30+1+ IXN

**Σύνθεση:** 15% συνολικό άζωτο ( 10,2% νιτρικό και 4,8% αμμωνιακό), 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (υδατοδιαλυτός), 30% K<sub>2</sub>O (υδατοδιαλυτό), 1,3% MgO, (υδατοδιαλυτό), 9% SO<sub>3</sub> (υδατοδιαλυτό)  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Cu\*, 0,05% Fe\*, 0,05% Mn\*, 0,001% Mo, 0,02% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

**Ιδανικό για κάθε καλλιέργεια ειδικά στο στάδιο της καρποφορίας και ωρίμανσης των φρούτων και λαχανικών και για αποδόσεις υψηλής ποιότητας.**



### Complestal® Solub 12-32-14+3+IXN

**Σύνθεση:** 12% συνολικό άζωτο ( 4,6% νιτρικό και 7,4% αμμωνιακό), 32% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (υδατοδιαλυτός), 14% K<sub>2</sub>O, 3% MgO, 3% S, Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Cu\*, 0,05% Fe\*, 0,05% Mn\*, 0,001% Mo, 0,02% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

**Συνίσταται για κάθε καλλιέργεια ειδικά για τα αρχικά στάδια για ανάπτυξη της ρίζας και γενικότερα του ριζικού συστήματος.**



### Complestal® Solub 20-19-19+IXN

**Σύνθεση:** 20% συνολικό άζωτο (5% νιτρικό 3,8% αμμωνιακό και 11,2% ουρικό)19% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (υδατοδιαλυτός), 19% K<sub>2</sub>O, 0,5% MgO, 0,8% S  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,04% Cu\*, 0,1% Fe\*, 0,1% Mn, 0,003% Mo, 0,04% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

**Κατάλληλο για ενίσχυση των καλλιεργειών στις φάσεις υψηλής δραστηριότητας και για όλα τα στάδια ανάπτυξης.**



# NovaTec® Solub

## Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα

Τα “Εξυπνα” υδατοδιαλυτά λιπάσματα.

Ιδανικά για υδρολίπανση και χρήση σε κάθε καλλιέργεια, χαρακτηρίζονται από την παρεμποδιστική δράση στο χρόνο νιτροποίησης του αμμωνιακού αζώτου.

Εξελιγμένη διαχείριση αζώτου που συνδέει την έρευνα και την τεχνολογία με τις σύγχρονες οικολογικές απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος, του χρήστη, του τελικού προϊόντος και του καταναλωτή.





**NovaTec® Solub N-Mag Dos+ 20-0-0+2MgO+IXN**  
**Σύνθεση:** 20% συνολικό άζωτο (100% αμμωνιακό), 2% MgO, 60% SO<sub>3</sub>. Ιχνοστοιχεία : 0,2% Fe, 0,1% Zn  
**Σταθεροποιημένη θειική αμμωνία με μαγνήσιο, σίδηρο και ψευδάργυρο. Κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια με υψηλές ανάγκες σε άζωτο. Ιδανικό για δενδρώδεις καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις των τριών ιχνοστοιχείων.**



**NovaTec® Solub 21 21-0-0+24 S**  
**Σύνθεση:** 21% συνολικό άζωτο (100% αμμωνιακό), 24% S  
**Άζωτο σε 100% σταθεροποιημένη αμμωνιακή μορφή. Ιδανικό για κάθε καλλιέργεια για σταδιακή τροφοδοσία σε άζωτο με στρωτή ανάπτυξη και πολύ καλό χρωματισμό.**



**NovaTec® Solub 14-48 -0**  
**Σύνθεση:** 14% συνολικό άζωτο (100% αμμωνιακό), 48% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 5% S  
**Άζωτο σε 100% σταθεροποιημένη αμμωνιακή μορφή. Πλούσιο σε φώσφορο ιδανικό για σταδιακή τροφοδοσία σε άζωτο αλλά και για τη βελτίωση της ριζοβολίας και γενικά του ριζικού συστήματος.**



**NovaTec® Solub 9-0-43**  
**Σύνθεση:** 9% συνολικό άζωτο (3% νιτρικό, 6% καρβαμδική μορφή), 43% K<sub>2</sub>O, 30% SO<sub>3</sub>  
**Το άζωτο βρίσκεται σε νιτρική αλλά και σε μορφή ουρίας. Πλούσιο σε κάλιο για υψηλότερη συγκομιδή και καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.**



**NovaTec® Solub 18-18-18 + IXN**  
**Σύνθεση:** 18% συνολικό άζωτο (9,8% νιτρικό, 8,2% αμμωνιακό), 18% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (υδατοδιαλυτός), 18% K<sub>2</sub>O, 1% MgO, 0,8% S  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Cu\*, 0,05% Fe\*, 0,05% Mn, 0,001% Mo, 0,02% Zn\*  
**Ιδανικό για ενίσχυση των καλλιεργειών στις φάσεις υψηλής δραστηριότητας και για όλα τα στάδια ανάπτυξης.**

\*100% EDTA Χηλική μορφή



**NovaTec® Solub Olivo 21-0-0+0,2% B+24%S**  
**Σύνθεση:** 21% συνολικό άζωτο (100% αμμωνιακό), 0,2% B, 24% S  
**Περιέχει άζωτο αποκλειστικά σε σταθεροποιημένη μορφή. Ιδανικό για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της ελιάς στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης, σε άζωτο αλλά και στο άκρως απαραίτητο βόριο.**

Γενική δοσολογία > Υδρολίπάνσεις : 4 - 6 κιλά/ στρέμμα

Η λίπανση των καλλιεργειών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, γι' αυτό και η συμβουλή του τοπικού Γεωπόνου είναι απαραίτητη.

# NovaTec® Solub



Προστιθέμενη αξία με υψηλή απόδοση



\* Από συγκριτικές μελέτες με κοινά λιπάσματα αποδεικνύεται πως η χρήση των NOVATEC® SOLUB , αυξάνει σημαντικά την απορρόφηση από τις ρίζες στοιχείων όπως του φωσφόρου , μαγγάνιου, ψευδάργυρου, χαλκού κ.α.



Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα

Novatec® Solub

Δράση

## ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ NOVATEC® SOLUB




$\text{NH}_2^-$  Ουρικό Άζωτο |  $\text{NH}_4^+$  Αμμωνιακό Άζωτο |  $\text{NO}_2^-$  Νιτρώδες Άζωτο |  $\text{NO}_3^-$  Νιτρικό Άζωτο

## Τιμές Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας (mS/cm in 25° C)



## Τιμές pH



Novatec® Solub 21-0-0

EXPERTS  
FOR GROWTH



# Complestal® Calcidic

Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα

Νέας τεχνολογίας NPK υδατοδιαλυτά λιπάσματα με ιχνοστοιχεία και ασβέστιο, κατάλληλα για υδρολίπανση σε κάθε καλλιέργεια. Διαχείριση θρέψης που συνδυάζει σε ένα προϊόν και με μία μόνο εφαρμογή, όλα τα απαραίτητα για το φυτό θρεπτικά στοιχεία. Λιπάσματα μεγάλης διαλυτότητας αλλά χαμηλής οξύτητας και ηλεκτρικής αγωγιμότητας.





Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα

Complestal® Calcidic

Διαθέσιμοι Τύποι



#### Complestal® Calcidic Complete 16-16-16+5

**Σύνθεση:** 16% συνολικό άζωτο (11% νιτρικό και 5% αμμωνιακό), 16% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 16% K<sub>2</sub>O, 5% CaO, 0,01% B, 0,05% Fe\*, 0,02% Cu\*, 0,05% Mn\*, 0,02% Zn\*

\*Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA

**Υδατοδιαλυτό NPK ισόρροπο λίπασμα πλούσιο σε ασβέστιο και ιχνοστοιχεία. Κατάλληλο για ενίσχυση των καλλιεργειών στις φάσεις υψηλής δραστηριότητας.**



#### Complestal® Calcidic N-Max 20-8-11+5

**Σύνθεση:** 20% συνολικό άζωτο (12,7% νιτρικό και 7,3% αμμωνιακό), 8% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 11% K<sub>2</sub>O, 5% CaO, 0,01% B, 0,05% Fe\*, 0,02% Cu\*, 0,05% Mn\*, 0,02% Zn\*

\*Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA

**Πλήρες λίπασμα, με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, ασβέστιο και ιχνοστοιχεία. Ιδανικό για τα πρώτα στάδια κάθε καλλιεργείας τη βλαστική ανάπτυξη.**



#### Complestal® Calcidic P-Max 12-29-12+6

**Σύνθεση:** 12% συνολικό άζωτο (7,7% νιτρικό και 4,3% αμμωνιακό), 29% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 12% K<sub>2</sub>O, 6% CaO, 0,01% B, 0,05% Fe\*, 0,02% Cu\*, 0,05% Mn\*, 0,02% Zn\*

\*Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA

**Αυξημένης περιεκτικότητας φωσφόρου υδατοδιαλυτό λίπασμα με ασβέστιο και ιχνοστοιχεία. Συνιστάται για τα πρώτα στάδια εγκατάστασης της καλλιεργείας για τη δημιουργία πλούσιου και ανθεκτικού ριζικού συστήματος.**



#### Complestal® Calcidic K-Max 10-15-28+6

**Σύνθεση:** 10% Ολικό άζωτο (11% νιτρικό), 15% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 28% K<sub>2</sub>O, 6% CaO, 0,01% B, 0,05% Fe\*, 0,02% Cu\*, 0,05% Mn\*, 0,02% Zn\*

\*Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA

**Υδατοδιαλυτό λίπασμα με αυξημένη περιεκτικότητα σε κάλιο, πλούσιο σε ασβέστιο και ιχνοστοιχεία. Προτείνεται η χρήση του ειδικά κατά το στάδιο της διόγκωσης και ωρίμανσης των καρπών.**

EXPERTS  
FOR GROWTH



# Basaplant®

## Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα

Τα Basaplant® αποτελούν μια πλήρη σειρά υδατοδιαλυτών λιπασμάτων με ιχνοστοιχεία κατάλληλα για διαφυλλική εφαρμογή και υδρολίπανση. Παράγονται από κορυφαίας ποιότητας πρώτες ύλες και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες θρέψης κάθε καλλιεργείας όπως κηπευτικά, δενδροκομία, αμπέλι, εκτατικές καλλιεργείες κ.α.



Γενική δοσολογία > Υδρολίπανσεις : 4 - 6 κιλά/ στρέμμα

Η λίπανση των καλλιεργειών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, γι' αυτό και η συμβουλή του τοπικού Γεωπόνου είναι απαραίτητη.





#### BASAPLANT® Red 6-10-34+2+IXN

**Σύνθεση:** 6% συνολικό άζωτο (2,5% νιτρικό και 3,5% αμμωνιακό)  
10% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 34% K<sub>2</sub>O, 2,4% MgO, 12% S  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Cu\*, 0,05% Fe\*, 0,05% Mn\*,  
0,001% Mo, 0,02% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

**Λίπασμα με αυξημένη συγκέντρωση καλίου, ιχνοστοιχείων και μαγνησίου. Χρήση σε κάθε καλλιέργεια ειδικά στο στάδιο της καρποφορίας για διόγκωση και ωρίμανση φρούτων και λαχανικών. Ιδανικό για αποδόσεις υψηλής ποιότητας.**



#### BASAPLANT® Orange 14-5-30+IXN

**Σύνθεση:** 14% συνολικό άζωτο (8,4% νιτρικό και 5,6% αμμωνιακό)  
5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 30% K<sub>2</sub>O, 1,1% MgO, 6% S  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Cu\*, 0,05% Fe\*, 0,05% Mn\*,  
0,001% Mo, 0,02% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

**NPK λίπασμα με αυξημένη συγκέντρωση σε κάλιο και ιχνοστοιχεία. Κατάλληλο στο στάδιο της καρποφορίας για διόγκωση και ωρίμανση φρούτων και λαχανικών για αποδόσεις υψηλής ποιότητας.**



#### BASAPLANT® Starter 13-36-13+IXN

**Σύνθεση:** 13% συνολικό άζωτο (3,8% νιτρικό και 9,2% αμμωνιακό) 36% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 13% K<sub>2</sub>O, 0,3% MgO, 3% S  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Cu, 0,05% Fe\*, 0,05% Mn\*,  
0,001% Mo, 0,02% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

**Υδατοδιαλυτό NPK λίπασμα με αυξημένη συγκέντρωση σε φώσφορο και ιχνοστοιχεία. Ιδανικό για κάθε καλλιέργεια ειδικά ως «starter» στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του φυτού.**



#### BASAPLANT® Blue 19-5-5+IXN

**Σύνθεση:** 19% συνολικό άζωτο (2% νιτρικό και 17% αμμωνιακό)  
5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 5% K<sub>2</sub>O, 0,7% MgO, 16,5% SO<sub>3</sub>  
Ιχνοστοιχεία: 0,01% B, 0,02% Cu\*, 0,05% Fe\*, 0,05% Mn\*,  
0,001% Mo, 0,02% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

**Πλήρες λίπασμα με αυξημένη συγκέντρωση σε άζωτο και ιχνοστοιχεία. Ιδανικό για τα πρώτα στάδια κάθε καλλιέργειας, προάγοντας τη βλαστική ανάπτυξη.**



#### BASAPLANT® Green 16-16-16+IXN

**Σύνθεση:** 16% συνολικό άζωτο (10% νιτρικό και 6% αμμωνιακό)  
16% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 16% K<sub>2</sub>O, 1,1% MgO, 16,5% SO<sub>3</sub>  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Cu\*, 0,05% Fe\*, 0,05% Mn\*,  
0,001% Mo, 0,02% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

**Λίπασμα με ισόρροπη και ήπια αναλογία θρεπτικών συστατικών, με ιχνοστοιχεία. Κατάλληλο για ενίσχυση των καλλιεργειών στις φάσεις υψηλής δραστηριότητας.**



# Basfoliar® SP

## Διαφυλλικά Λιπάσματα

Λιπάσματα για διαφυλλική εφαρμογή με σύνθεση ειδικά σχεδιασμένη για τις συμπληρωματικές ανάγκες θρέψης της ελιάς.

Τροφοδοτούν στα κρίσιμα στάδια του βιολογικού κύκλου της καλλιέργειας με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της παραγωγής καθώς και της ελαιο-περιεκτικότητας του καρπού.





Διαφυλλικά Λιπάσματα

Basfoliar® SP

Διαθέσιμοι Τύποι



#### Basfoliar® Olivo SP

14-5-28+2MgO+2B+IXN

**Σύνθεση:** 14% συνολικό άζωτο (7,8% νιτρικό 1,0% αμμωνιακό, 5,2% ουρικό ) 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 28% K<sub>2</sub>O, 2% MgO, 2% B, 1,6% S. Ιχνοστοιχεία : 0,02% Cu\*, 0,04% Fe\*, 0,04% Mn\*, 0,001% Mo, 0,015% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

Διαφυλλικό πλήρες λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, μαγνήσιο και βόριο. Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία με σύνθεση ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες της ελιάς. Κατάλληλο για διαφυλλική εφαρμογή, από άνοιξη έως φθινόπωρο, για βελτίωση του μεγέθους της καρποφορίας και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου προϊόντος.

Δοσολογία > 2,5-5 gr/l (0,25% - 0,5%) ανά εφαρμογή



#### Basfoliar® Primavera SP

25-10-17+IXN

**Σύνθεση:** 25% συνολικό άζωτο (4,9% νιτρικό 2,9% αμμωνιακό, 17,2% ουρικό ), 10% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 17% K<sub>2</sub>O, 0,6% MgO, 4,4% S. Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Cu\*, 0,05% Fe\*, 0,05% Mn\*, 0,001 Mo, 0,02% Zn\*

\*100% EDTA Χηλική μορφή

Διαφυλλικό NPK λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο (κυρίως ουρικής μορφής). Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία με σύνθεση ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες της ελιάς. Κατάλληλο για ανοιξιάτικη διαφυλλική εφαρμογή. Παρέχει στην ελιά τις απαραίτητες μονάδες αζώτου καθώς και άλλων μάκρο και μικροστοιχείων διασφαλίζοντας τη ζωηρή ανάπτυξη και την πλούσια φυλλική επιφάνεια του δένδρου.

Δοσολογία > 2,5-5 gr/l (0,25% - 0,5%) ανά εφαρμογή

Η λίπανση των καλλιεργειών είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, γι' αυτό και η συμβουλή του τοπικού Γεωπόνου είναι απαραίτητη.

EXPERTS  
FOR GROWTH



# Hydrospeed® K-Max

Ειδικά Λιπάσματα

Το Hydrospeed® K-Max είναι εξευγενισμένη μορφή νιτρικού καλίου με ομοιόμορφη υφή κόκκων καλύτερη κοκκομετριά καθώς και με λιγότερα αδιάλυτα στερεά. Ιδανικό για χρήση σε υπαίθριες αλλά και σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες (Greenhouse Grade) με τη μέθοδο της υδρολίπανσης.



Hydrospeed® K-Max 13,5 - 0 -46,2

**Σύνθεση:** 13,5% συνολικό άζωτο (100% νιτρικό άζωτο), 46,2% K<sub>2</sub>O  
pH σε διάλυμα 1%: 6,5-7,5, πυκνότητα: 1g/ml





# Ιχνοστοιχεία

Επιλεγμένα κορυφαίας ποιότητας ιχνοστοιχεία κατάλληλα για κάθε καλλιέργεια.  
Αποτελούν μοναδικά σκευάσματα δίνοντας λύσεις σε εξειδικευμένα προβλήματα θρέψης.





**Basafer® Plus**

**Σύνθεση:** Χηλικό λίπασμα σιδήρου 6% EDDHA, με περιεκτικότητα 83% σε ortho-ortho. Ιδανικό για τη πρόληψη και αντιμετώπιση των τροφопενιών σιδήρου. Συστήνεται για εφαρμογή από το έδαφος.

Ομογενοποιημένοι μικρόκοκκοι ελεύθερης ροής με διάμετρο σωματιδίων μικρότερη από 0,5 mm (το 95%). Προϊόν πλήρως διαλυτό στο νερό στις συνιστώμενες δοσολογίες.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Χαρτοκιβώτιο 14x1 κιλό | 3x5 κιλά | 20 κιλά

Ενδεικτικές Δοσολογίες

Εφαρμογή από έδαφος

|                            | Στάδιο Εφαρμογής (gr / φυτό ή δένδρο) |                |                  |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
|                            | ΝΕΑΡΑ ΔΕΝΔΡΑ                          | ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ |
| Εσπεριδοειδή - Πυρηνόκαρπα | 10-30                                 | 40-60          | 75-100           |
| Μηλοειδή                   | 15-25                                 | 20-40          | 60-80            |
| Σταφύλια Επιτραπέζια       | 5-10                                  | 10-15          | 15-20            |
| Σταφύλια Οиноποιήσιμα      | 3-5                                   | 5-7            | 7-10             |
|                            | ΔΟΣΗ                                  |                |                  |
| Λαχανικά Μικρού Κύκλου     | 60-80 gr/100m <sup>2</sup>            |                |                  |
| Λαχανικά Μεγάλου Κύκλου    | 100-150gr/100m <sup>2</sup>           |                |                  |
| Φράουλες - Πεπόνια         | 100-150gr/100m <sup>2</sup>           |                |                  |
| Θάμνοι                     | 3-5 gr ανά φυτό                       |                |                  |
| Κηποτεχνικά Δένδρα         | 5-15 gr ανά φυτό                      |                |                  |
| Τριανταφυλλίες             | 5-10 gr ανά δένδρο                    |                |                  |
|                            |                                       |                |                  |



**Fetrilon® 13%**

**Σύνθεση:** Χηλικό λίπασμα σιδήρου 13% EDTA, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των τροφопενιών σιδήρου. Συστήνεται κυρίως για διαφυλλική εφαρμογή.

Πλήρως υδατοδιαλυτοί ομογενοποιημένοι μικρόκοκκοι ελεύθερης ροής. Το 95% των κόκκων έχουν μέγεθος μικρότερο από 0,5 mm.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Χαρτοκιβώτιο 16x1 κιλό

Ενδεικτικές Δοσολογίες

Διαφυλλικής Εφαρμογής

|                             | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ<br>ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΟΣΗ<br>(gr / στρ. εφαρμογή) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ<br>(gr/100lt) |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Εσπεριδοειδή                | 3-4                                        | 50-150                       | 200                               |
| Αμπέλι, Μηλοειδή            | 2-3                                        | 50-150                       | 100                               |
| Πυρηνόκαρπα                 | 2                                          | 50-70                        | 100                               |
| Καπνός                      | 2-3                                        | 30-70                        | 50                                |
| Βαμβάκι                     | 2-4                                        | 70-100                       | 300                               |
| Ζαχαρότευκλο                | 1-3                                        | 50-100                       | 200                               |
| Αραβόσιτος                  | 2                                          | 50-100                       | 300                               |
| Όσπρια                      | 2-3                                        | 50-70                        | 100                               |
| Πατάτες                     | 2-5                                        | 50-100                       | 300                               |
| Τομάτες, Μελπζάνες,Πιπεριές | 3-5                                        | 50-100                       | 200                               |
| Αγγούρια, Πεπόνια           | 3-4                                        | 50-100                       | 200                               |
| Λάχανα, Κουνουπιδια         | 3-5                                        | 50-100                       | 200                               |
| Σκόρδα, Κρεμμύδια           | 2-4                                        | 50-70                        | 200                               |
| Χλοτάπητες (γκαζόν)         | 1-2                                        | 50-100                       | 150                               |
|                             |                                            |                              |                                   |



Fetrilon® Combi 2

**Σύνθεση:** Μίγμα ιχνοστοιχείων σε χηλική EDTA μορφή με έμφαση στον σίδηρο και ψευδάργυρο ιδανικό για την πρόληψη και θεραπεία τροφοπενιών. Συνιστάται κυρίως για διαφυλλική εφαρμογή. 4,0% σίδηρος (Fe)\*, 1,5% βόριο (B), 4,0% ψευδάργυρος (Zn)\*, 0,05% μολυβδαίνιο (Mo), 3,0% μαγγάνιο (Mn)\*, 2,2% οξειδίο του μαγνησίου (MgO), 0,5% χαλκός (Cu)\*, 1,3% θείο (S).

\*100% EDTA Χηλική μορφή

Ομογενοποιημένοι μικρόκοκκοι, ελεύθερης ροής. Το 95% των σωματιδίων έχουν μέγεθος μικρότερο από 0,5 mm. Είναι προϊόν πλήρως υδατοδιαλυτό στις συνιστώμενες δοσολογίες. Το κορυφαίο μίγμα ιχνοστοιχείων με σύνθεση όμοια σε κάθε μικρόκοκκο (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ BLEND).

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Χαρτοκιβώτιο 16x1 κιλό

Ενδεικτικές Δοσολογίες

Διαφυλλικής Εφαρμογής

|                              | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ<br>ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΟΣΗ<br>(gr / στρ. εφαρμογή) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ<br>(gr/100lt) |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Εσπεριδοειδή                 | 3-4                                        | 50-150                       | 200                               |
| Αμπέλι, Γιγαπτόκαρπα         | 2-3                                        | 50-150                       | 100                               |
| Πυρηνόκαρπα                  | 2-3                                        | 50-70                        | 100                               |
| Καπνός                       | 2-3                                        | 30-70                        | 100                               |
| Βαμβάκι                      | 2-4                                        | 70-100                       | 300                               |
| Ζαχαρότευκλο, Σόργο          | 1-3                                        | 50-100                       | 200                               |
| Αραβόσπος                    | 2                                          | 50-100                       | 300                               |
| Όσπρια                       | 2-3                                        | 50-70                        | 200                               |
| Πατάτες                      | 2-5                                        | 50-100                       | 300                               |
| Τομάτες, Μελιτζάνες,Πιπεριές | 3-5                                        | 50-100                       | 200                               |
| Αγγούρια, Πεπόνια            | 2-4                                        | 50-100                       | 200                               |
| Λάχανα, Κουνουπίδια          | 3-5                                        | 50-100                       | 200                               |
| Σκόρδα, Κρεμμύδια            | 2-4                                        | 50-70                        | 200                               |



Nutribor®

**Σύνθεση:** Υδατοδιαλυτό λίπασμα μίγμα ιχνοστοιχείων με βόριο, μαγγάνιο, μολυβδαίνιο καθώς και νιτρικό άζωτο μαγγνήσιο και θείο. Κατάλληλο για καλλιέργειες απαιτητικές σε βόριο όπως ελιά, σταυρανθή, τεύτλα, καλαμπόκι, λάχανα κ.α. 8% βόριο (B), 6% ολικό άζωτο, 5% οξειδίο του μαγνησίου (MgO), 1% μαγγάνιο (Mn)\*, 0,04 % μολυβδαίνιο (Mo), 0,1 % ψευδάργυρος (Zn)\*, 12% θείο (S). Όλα τα στοιχεία είναι πλήρως υδατοδιαλυτά.

\*100% EDTA Χηλική μορφή

Ομογενοποιημένο, ελεύθερης ροής κρυσταλλικό προϊόν. Πλήρως υδατοδιαλυτό στις συνιστώμενες δόσεις με σωματίδια κατά 95% μικρότερα από 1 mm.

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Χαρτοκιβώτιο 20x1 κιλό | σάκος 15 κιλών

Ενδεικτικές Δοσολογίες

Διαφυλλικής Εφαρμογής

|                     | ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΟΣΗ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ<br>(gr / στρέμμα) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ<br>(έτος /gr/στρέμμα) |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Τεύτλα              | 200                                       | 600                                             |
| Πατάτες             | 50                                        | 200                                             |
| Καλαμπόκι           | 50                                        | 200                                             |
| Ηλίανθος            | 100                                       | 400                                             |
| Ψυχανθή (σπόροι)    | 50                                        | 100                                             |
| Μηδική, Τριφύλλια   | 50                                        | 600                                             |
| Λάχανα, Κουνουπίδια | 100                                       | 400                                             |
| Ελαιокράνδη         | 100                                       | 400                                             |
|                     | ΔΟΣΗ                                      |                                                 |
| Ελιά                | 100-150 gr/100 lt νερό                    |                                                 |



**Zitrilon® SM 15%**  
**Σύνθεση:** Πλήρως υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος σε χηλική EDTA μορφή, περιεκτικότητας 15%. Κατάλληλος για πρόληψη και θεραπεία χλωρώσεων από έλλειψη ψευδαργύρου σε οπωροφόρα, αμπέλι, εσπεριδοειδή, κηπευτικά και άλλες καλλιέργειες.

**Κρυσταλλικό προϊόν ελεύθερης ροής. Πλήρως υδατοδιαλυτό στις συνιστώμενες δόσεις με σωματίδια κατά 90% μικρότερα από 0,5 mm.**


ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Χαρτοκιβώτιο 20x1 κιλό | σάκος 25 κιλών

## Ενδεικτικές Δοσολογίες

Διαφυλλικής Εφαρμογής

|                               | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ<br>ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΟΣΗ<br>(gr / στρ. εφαρμογή) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ<br>(gr/100lt) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Εσπεριδοειδή                  | 3-4                                        | 50-150                       | 200                               |
| Μηλοειδή, Αμπέλια             | 2-3                                        | 50-150                       | 100                               |
| Άλλα Οπωροφόρα                | 2                                          | 50-70                        | 100                               |
| Κηπευτικά, Μποστανικά         | 3-5                                        | 50-100                       | 200                               |
| Πατάτες                       | 2-5                                        | 50-100                       | 300                               |
| Φασόλια, Φιστίκια, Μηδική     | 1-3                                        | 50-100                       | 200                               |
| Αρακάς, Ρεβίθια, Λοιπά Όσπρια | 2-3                                        | 50-70                        | 100                               |
| Καλαμπόκι                     | 1-2                                        | 20-30                        | 100                               |
|                               |                                            |                              |                                   |



**Nutrimix® Complete**  
**Σύνθεση:** Μίγμα ικνοστοιχείων σε χηλική EDTA μορφή με έμφαση στο χαλκό, μαγγάνιο, ψευδάργυρο και σίδηρο, ιδανικό για τη πρόληψη και θεραπεία τροφопениών. Περιέχει επίσης άζωτο σε αμμωνιακή μορφή καθώς και θείο. Είναι λόγω της σύνθεσής του ιδιαίτερα κατάλληλο για καλλιέργειες σιτηρών για διαφυλλική εφαρμογή. Περιέχει 3,5% αμμωνιακό άζωτο (NH<sub>4</sub>-N), 3% οξείδιο του Μαγνησίου (MgO), 30% τριοξείδιο του θείου (SO<sub>3</sub>) , 3% Χαλκό (Cu), 3% Σίδηρο (Fe), 4% Μαγγάνιο (Mn), 0,04% Μολυβδαίνιο (Mo), 3% Ψευδάργυρο Zn.

**Μικρόκοκκοι ελεύθερης ροής. Το 95% των σωματιδίων έχουν μέγεθος μικρότερο από 1 mm.**  
**Το προϊόν είναι πλήρως υδατοδιαλυτό στις συνιστώμενες δοσολογίες.**

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Σάκος 15 κιλών

## Ενδεικτικές Δοσολογίες

Διαφυλλικής Εφαρμογής

|         | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ<br>ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΟΣΗ<br>(gr / στρ. εφαρμογή) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ<br>(%) |
|---------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Σπάρι   | 2-4                                        | 100-200                      | 0,4-0,5                    |
| Κριθάρι | 2-4                                        | 100-200                      | 0,4-0,5                    |
| Βρώμη   | 2-4                                        | 100                          | 0,4-0,5                    |
| Σίκαλη  | 2-4                                        | 100                          | 0,4-0,5                    |
| Ρύζι    | 2-4                                        | 100                          | 0,4-0,5                    |
|         |                                            |                              |                            |



# Υγρά Λιπάσματα

Επιλεγμένα, κορυφαίας ποιότητας και υψηλής καθαρότητας υγρά λιπάσματα  
ιδανικά για κάθε καλλιέργεια.  
Αποτελούν μοναδικά και καινοτόμα σκευάσματα δίνοντας λύσεις  
σε εξειδικευμένα προβλήματα θρέψης.





Avant® Natur 8-4-6

Υγρό παρασκεύασμα αμινοξέων

**Σύνθεση:** 8,1% συνολικό άζωτο (3,0 % σε οργανική μορφή, 1,8% νιτρικό, 1,1% αμμωνιακό και 2,2% ουρικό άζωτο), 4% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 6% K<sub>2</sub>O ,5,7% ελεύθερα L - αμινοξέα, 30% συνολική οργανική ουσία

**Υγρό οργανικό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε αμινοξέα, 100% φυτικής προέλευσης εμπλουτισμένο με ανόργανο άζωτο, φώσφορο και κάλιο.**  
Τα αμινοξέα προέρχονται αποκλειστικά από ενζυματική δραστηριότητα που διαφυλάσσει τη σύνθεση και την ποιότητα των αμινοξέων, σε μορφή απόλυτα αφομοιώσιμη από τα φυτά.

Ιδανικό για διαφυλλική εφαρμογή αλλά και υδρολίπανση, κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα | Δοχείο 10 λίτρων

Δοσολογίες Διαφυλλικής Εφαρμογής

|                                                | Συγκ. Ψεκ. Διαλ. % | ΣΤΑΔΙΟ                                        |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Εσπεριδοειδή                                   | 0,25               | Πρίν και μετά την ανθοφορία ανά 2-3 εβδομάδες |
| Ελιές                                          | 0,3                | Πρίν και μετά την ανθοφορία                   |
| Αμπέλια                                        | 0,3                | Πρίν και μετά την ανθοφορία                   |
| Κηπευτικά                                      | 0,25               | Μετά τη μεταφύτευση ανά 2-4 εβδομάδες         |
| Δέντρα                                         | 0,25               | Μετά την ανθοφορία ανά 2-5 εβδομάδες          |
| Βαμβάκι                                        | 0,3                | Σε περιόδους stress                           |
| Ριζοπότισμα: 1,5 - 2 lt ανά στρέμμα / εφαρμογή |                    |                                               |



Avant® Natur Pur

Υγρό παρασκεύασμα αμινοξέων

**Σύνθεση:** 5,5% συνολικό άζωτο (οργανικής μορφής) 10,3% ελεύθερα L - αμινοξέα 37,3% συνολική οργανική ουσία.

**Υγρό οργανικό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε αμινοξέα, 100% φυτικής προέλευσης.**  
Τα αμινοξέα προέρχονται αποκλειστικά από ενζυματική δραστηριότητα που διαφυλάσσει τη σύνθεση και την ποιότητα των αμινοξέων, σε μορφή απόλυτα αφομοιώσιμη από τα φυτά.  
Ιδανικό για διαφυλλική εφαρμογή αλλά και υδρολίπανση, κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα | Δοχείο 10 λίτρων

Δοσολογίες Διαφυλλικής Εφαρμογής

|                                                | Συγκ. Ψεκ. Διαλ. % | ΣΤΑΔΙΟ                                        |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Εσπεριδοειδή                                   | 0,25               | Πρίν και μετά την ανθοφορία ανά 2-3 εβδομάδες |
| Ελιές                                          | 0,3                | Πρίν και μετά την ανθοφορία                   |
| Αμπέλια                                        | 0,3                | Πρίν και μετά την ανθοφορία                   |
| Κηπευτικά                                      | 0,25               | Μετά τη μεταφύτευση ανά 2-4 εβδομάδες         |
| Δέντρα                                         | 0,25               | Μετά την ανθοφορία ανά 2-5 εβδομάδες          |
| Βαμβάκι                                        | 0,3                | Σε περιόδους stress                           |
| Ριζοπότισμα: 1,5 - 2 lt ανά στρέμμα / εφαρμογή |                    |                                               |



**Complesal® fluid green 10-4-7**  
**Σύνθεση:** 10% συνολικό άζωτο (8,5 % αμιδικό, 1,5 % νιτρικό), 4% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 7% K<sub>2</sub>O ,  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn, 0,002% Cu, 0,001% Mo

Ένα πυκνό υγρό λίπασμα αζώτου, εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία. Είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα πρώτα στάδια της βλαστικής ανάπτυξης των φυτών, όπου οι ανάγκες σε άζωτο είναι αυξημένες.

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα | Δοχείο 10 λίτρων

Δοσολογίες

|                            | ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ<br>ΔΟΣΗ/ΣΤΡΕΜΜΑ | ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ<br>Συγκ. Ψεκ. Διαλ. % |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα | 1 - 3 lt                    | 0,2 - 0,3                                 |
| Καρπούζι, Πεπόνι           | 2 - 4 lt                    | 0,2 - 0,4                                 |
| Δενδρώδεις Καλλιέργειες    | 2 - 5 lt                    | 0,2 - 0,4                                 |
| Φυτώρια                    | -                           | 0,1 - 0,2                                 |
| Σπινρά                     | -                           | 0,2 - 0,5                                 |
| Βαμβάκι                    | 3 - 5 lt                    | 0,2 - 0,4                                 |
| Τριφύλλι, Μηδική           | -                           | 0,2 - 0,3                                 |
|                            |                             |                                           |



**Complesal® fluid red 5-8-10**  
**Σύνθεση:** 5% συνολικό άζωτο (ουρικό), 8% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 10% K<sub>2</sub>O ,  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn, 0,002% Cu, 0,001% Mo

Ένα υγρό NPK λίπασμα, εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία. Είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα στάδια των φυτών που απαιτείται υψηλή πρόσληψη φωσφόρου και καλίου.

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα | Δοχείο 10 λίτρων

Δοσολογίες

|                            | ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ<br>ΔΟΣΗ/ΣΤΡΕΜΜΑ | ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ<br>Συγκ. Ψεκ. Διαλ. % |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα | 1 - 5 lt                    | 0,2 - 0,3                                 |
| Καρπούζι, Πεπόνι           | 2 - 4 lt                    | 0,2 - 0,4                                 |
| Δενδρώδεις Καλλιέργειες    | 2 - 5 lt                    | 0,2 - 0,4                                 |
| Αμπέλι                     | 2 - 5 lt                    | 0,2 - 0,4                                 |
|                            |                             |                                           |



Novatec® fluid 20

**Σύνθεση:** 20% συνολικό άζωτο (10% αμμωνιακό, 10% νιτρικό),  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,02% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn, 0,002% Cu, 0,001% Mo

Ένα πυκνό υγρό λίπασμα αζώτου, εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει τη σταδιακή διάθεση του στοιχείου στα φυτά, ενώ παράλληλα αποτρέπονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες από την απότομη και αυξημένη αζωτούχο λίπανση.

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Δοχείο 20 λίτρων

Δοσολογίες

Υδρολίπανση: 1 - 5 lt ανά στρέμμα

|                  | ΣΤΑΔΙΟ                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Κηπευτικά        | Στα πρώτα στάδια μετά την μεταφύτευση                  |
| Φυλλώδη Λαχανικά | Κατά την διάρκεια ανάπτυξης των φύλλων                 |
| Εσπεριδοειδή     | Πρίν την άνθηση                                        |
| Πυρηνόκαρπα      | Μετά την πτώση των μετάλων και στο φούσκωμα του καρπού |
| Αμπέλια          | Στο στάδιο της βλάστησης και στο φούσκωμα της ράγας    |
| Βαμβάκι          | Μετά το στάδιο 6-8 φύλλων                              |
| Ελιά             | Πριν την άνθηση και μετά το δέσιμο του καρπού          |
| Κολαμπόκι        | Στο στάδιο των 2-6 φύλλων                              |
|                  |                                                        |



Vitanica® Si

**Σύνθεση:** 5 % συνολικό άζωτο, 3% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 7% K<sub>2</sub>O , 1,7% Na, 10% SiO<sub>3</sub>, 22,7% εκχύλισμα Ecklonia maxima.

Ένα οργανο-ανόργανο, υγρό λίπασμα NPK, συνδισασμένο με πυρίτιο και εκχύλισμα φυκιών. Χρησιμοποιείται κυρίως διαφυλλικά με σκοπό την ενίσχυση της αντοχής των καρπών, την βελτίωση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών και την αύξηση της μετασυλλεκτικής τους αντοχής.

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα | Δοχείο 10 λίτρων

Δοσολογίες Διαφυλλικής Εφαρμογής

|         | Συγκ. Ψεκ. Διαλ. % | ΣΤΑΔΙΟ                                                    |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Αμπέλια | 0,25 - 0,5         | 2-3 εφαρμογές, μετά το γυάλισμα της ράγας                 |
| Τομάτα  | 0,25 - 0,5         | Στο στάδιο μεγένθυσης του καρπού                          |
| Ρόδι    | 0,25 - 0,5         | 2-3 εφαρμογές, στο στάδιο ωρίμανσης                       |
| Κεράσι  | 0,25 - 0,5         | 2-3 εφαρμογές, στο στάδιο ωρίμανσης                       |
| Ρύζι    | 0,25 - 0,3         | 2 εφαρμογές, πριν την περίοδο εμφάνισης της πυρικουλάριας |
|         |                    |                                                           |



**Basfoliar® 36 Extra 27-0-0+3MgO+IXN**  
**Σύνθεση:** 27% συνολικό άζωτο (18,7% καρβαμδικό, 3,6% αμμωνιακό, 4,7% νιτρικό) 3% Μαγνήσιο (MgO)  
Ιχνοστοιχεία 1% Mn, 0,02% Fe, 0,2% Cu, 0,01% Zn, 0,02% B, 0,005% Mo

Υγρό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο (ειδικά καρβαμδικής μορφής), μαγνήσιο και μαγγάνιο. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εντατικές καλλιέργειες όπως σπωρολαχανικών, αμπελιού καλλωπιστικών όταν εκτός από την υψηλή επιπλέον απαίτηση σε άζωτο υφίσταται και υψηλή ανάγκη σε μαγνήσιο και μαγγάνιο. Ιδανικό και για διαφυλλική εφαρμογή.  
Κατάλληλο επίσης και για εκτατικές καλλιέργειες όπως σιτάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι.

Διαθέσιμες Συσκευασίες>

Χαρτοκιβώτιο 12x1 λίτρο

Δοχείο 20 λίτρων

Δοσολογίες

|                                                                                                                                                                                                | ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ<br>ΔΟΣΗ/ΣΤΡΕΜΜΑ | ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ<br>Συγκ. Ψεκ. Διαλ. % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Μηλοειδή <sup>1</sup>                                                                                                                                                                          | 0,75 - 1,2 lt               | 0,5 - 0,8                                 |
| Πυρηνόκαρπα                                                                                                                                                                                    | 0,35 - 0,45 lt              | 0,25 - 0,3                                |
| Φράουλες <sup>2</sup>                                                                                                                                                                          | 0,3 - 0,5 lt                | 0,2 - 0,25                                |
| Αμπέλια (όχι στην άνθιση)                                                                                                                                                                      | Max 0,45 lt                 | 0,3                                       |
| Λάχανο, Κουνουπίδι <sup>2</sup>                                                                                                                                                                | 0,8 - 1,2 lt                | 2 - 3                                     |
| Τομάτες <sup>2</sup>                                                                                                                                                                           | 0,3 - 0,6 lt                | 0,75 - 1                                  |
| Μαρούλια <sup>2</sup>                                                                                                                                                                          | 0,2 - 0,4 lt                | 0,4 - 0,6                                 |
| Αγγούρια <sup>2</sup>                                                                                                                                                                          | 0,2 - 0,6 lt                | 0,5 - 1                                   |
| Πατάτες, Ψυχανθή <sup>2</sup>                                                                                                                                                                  | 0,6 - 1,2 lt                |                                           |
| Τεύτλα <sup>2</sup>                                                                                                                                                                            | 0,4 - 1 lt                  |                                           |
| Σπάρι, Καλαμπόκι                                                                                                                                                                               |                             | 0,5 - 1 λίτρο/στρέμμα                     |
| <div>1. Σε είδη μηλιάς με πρόβλημα σκουριάς π.χ. GOLDEN DELICIOUS να μην εφαρμόζεται πριν ο καρπός αποκτήσει μέγεθος καρυδιού.<br/>2. Ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος 40 λίτρα / στρέμμα.</div> |                             |                                           |

Ειδικά για τα σιτηρά, καλαμπόκι χρησιμοποιούμε το προϊόν μαζί με ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα με δόση 0,5 -1 λίτρο/στρέμμα.



**Basfoliar® Aktiv 3-27-18+IXN**  
**Σύνθεση:** 3,0% συνολικό άζωτο (ουρικής μορφής), 27% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 0,01% B, 0,02% Cu\*, 0,02% Fe\*, 0,01% Mn\*, 0,001% Mo, 0,01% Zn\*, 3% οργανική ουσία  
\*100% EDTA Χηλική μορφή

Υγρό NPK λίπασμα που περιέχει εκχυλίσματα φυκιών *Ecklonia maxima* και ιχνοστοιχεία σε χηλική EDTA μορφή. Πλούσιο σε φυτορμόνες, αμινοξέα, και βιταμίνες. Κατάλληλο για διαφυλλική εφαρμογή αλλά και υδρολίπανση.

Διαθέσιμες Συσκευασίες>

Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα

Δοχείο 10 λίτρων

Δοσολογίες Διαφυλλικής Εφαρμογής

|                                                                                                                        | ΔΟΣΗ/ΣΤΡΕΜΜΑ | ΣΤΑΔΙΟ                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αμπέλι                                                                                                                 | 0,2 - 0,3 lt | Πρίν την ανθοφορία έως την έναρξη του γαλαίματος της ράγας.<br>2-3 εφαρμογές, ανάλογα τις ανάγκες της καλλιέργειας                           |
| Δενδροκομία                                                                                                            | 0,2 - 0,3 lt | Μετά την άνθιση έως την έναρξη χρωματισμού των καρπών.<br>2-3 εφαρμογές ανά 3-4 εβδομάδες                                                    |
| Κηπευτικά                                                                                                              | 0,2 - 0,3 lt | Μετά τη μεταφύτευση. Περισσότερες από 1 επαναλήψεις                                                                                          |
| Αγγούρι                                                                                                                | 0,2 - 0,3 lt | Μετά τη μεταφύτευση. 2-4 εφαρμογές ανά 2 εβδομάδες                                                                                           |
| Τομάτα                                                                                                                 | 0,2 - 0,3 lt | Από τη μεταφύτευση έως την έναρξη μεταχρωματισμού των καρπών.<br>Περισσότερες από 1 εφαρμογές                                                |
| Σαλάτες                                                                                                                | 0,2 lt       | Ριζοπότισμα στο δίσκο πριν την μεταφύτευση με διάλυμα συγκέντρωσης 0,2% και μετά την μεταφύτευση με τη δόση με περισσότερες από 1 εφαρμογές. |
| Στις διαφυλλικές εφαρμογές η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 40 λίτρα το στρέμμα. |              |                                                                                                                                              |

Δοσολογία Υδρολίπανσης: 1,5 - 5 lt /στρέμμα / εφαρμογή



**Basfoliar® Combi-stipp 9-0-0+15+IXN**  
**Σύνθεση:** 9% συνολικό άζωτο N (8,5% νιτρικό άζωτο και 0,5% αμμωνιακό άζωτο),  
1% MgO, 15% CaO, 0,2% B, 0,4% Mn\*, 0,01% Zn\*  
\*100% EDTA Χημική μορφή

Υγρό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και ασβέστιο με ιχνοστοιχεία. Ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση των τροφοπενιών ασβεστίου. Κατάλληλο για διαφυλλική εφαρμογή αλλά και υδρολίπανση. Μοναδικός συνδυασμός ασβεστίου με βόριο και ιχνοστοιχεία.

Διαθέσιμες Συσκευασίες> Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα | Δοχείο 10 λίτρων

Δοσολογίες Διαφυλλικής Εφαρμογής

|                 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ | ΔΟΣΗ/ΣΤΡΕΜΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ               |
|-----------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Μηλοειδή        | 0,2 - 0,5%  | 0,3 - 0,6 lt | 3-8 από δέσιμο καπού           |
| Τομάτα, Πιπεριά | 0,1 - 0,3%  | 0,1 - 0,3 lt | 3-6 από έναρξη άνθισης         |
| Αγγούρι         | 0,1 - 0,3%  | 0,1 - 0,3 lt | 3-6 από έναρξη άνθισης         |
| Μαρούλι         | 0,2%        | 0,2 lt       | 2 από μεταφύτευση              |
| Λάχανο          | 1%          | 0,3 - 0,5 lt | 2-5 πριν το σχηματισμό κεφαλής |
|                 |             |              |                                |

Δοσολογία Υδρολίπανσης: 2 - 5 lt /στρέμμα / εφαρμογή



# Floranid®

## Λιπάσματα Βραδείας Απελευθέρωσης

Τα λιπάσματα FLORANID® είναι εξελιγμένα Γερμανικά προϊόντα θρέψης από την έρευνα της BASF. Μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε αζωτούχο θρέψη του χλοοτάπητα και άλλων καλλιεργειών για χρονικό διάστημα έως και 4 μήνες. Η αυξημένη διάρκεια της αζωτούχου θρέψης οφείλεται στο ISODUR® (μορφή οργανικού αζώτου), που αποδομείται σταδιακά σε αφομοιώσιμες από τα φυτά, μορφές αζώτου.





Λιπάσματα Βραδείας Απελευθέρωσης

Floranid®

Διαθέσιμοι Τύποι



#### Floranid® Rasen 20-5-8+2+IXN

**Σύνθεση:** 20% συνολικό άζωτο (2,5% νιτρικό 8,0% αμμωνιακό, 9,5% ISODUR®), 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 8% K<sub>2</sub>O, 2% MgO, 7% S.  
Ιχνοστοιχεία: 0,01% B, 0,002% Cu, 0,3% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn  
**Μέγεθος κόκκου:** 0,7 - 2,8 mm

Λίπασμα πλούσιο σε μονάδες αζώτου και ISODUR®, ιδανικό για ταχύτατα αποτελέσματα. Διάρκεια δράσης του αζώτου έως και 4 μήνες. Κατάλληλο για συντηρήσεις σε χλοοτάπητες υψηλών απαιτήσεων όπως αθλητικά στάδια, γήπεδα γκολφ, ιδιωτικά έργα. Συνιστάται για ανοιξιότικη και φθινοπωρινή εφαρμογή και μόνο για επιφανειακή χρήση.

**ΔΟΣΕΙΣ:** 20-40 gr / m<sup>2</sup> / εφαρμογή



#### Floranid® Permanent 16-7-15+2+IXN

**Σύνθεση:** 16% συνολικό άζωτο (2,1% νιτρικό 7,9% αμμωνιακό, 6% ISODUR®), 7% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 15% K<sub>2</sub>O, 2% MgO, 9% S.  
Ιχνοστοιχεία: 0,01% B, 0,002% Cu, 0,5% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn  
**Μέγεθος κόκκου:** 0,7 - 2,8 mm

Ισορροπημένο λίπασμα ήπιας σύνθεσης, ιδανικό για όλες τις εποχές και κάθε καλλιέργεια όπως χλοοτάπητες, κηπευτικά, άνθη, δέντρα, θάμνοι και φυτώρια. Κατάλληλο για βασική και επιφανειακή λίπανση με διάρκεια δράσης του αζώτου έως και τους 4 μήνες.

**ΔΟΣΕΙΣ:** Για χλοοτάπητες 30-50gr/m<sup>2</sup>/εφαρμογή, για γλαστρικά φυτά 1-3 gr / λίτρο γλάστρας και για επιφανειακή λίπανση άλλων καλλιεργειών και φυτωρίων 30-50gr/m<sup>2</sup>.



#### Floranid® Master Extra 19-5-10+2+IXN

**Σύνθεση:** 19% συνολικό άζωτο (2,5% νιτρικό 8,0% αμμωνιακό, 8,5% ISODUR®), 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 10% K<sub>2</sub>O, 2% MgO, 8% S.  
Ιχνοστοιχεία : 0,01% B, 0,002% Cu, 0,5% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn  
**Μέγεθος κόκκου:** 0,5 – 1,8 mm

Η λύση που καλύπτει και τους πιο απαιτητικούς. Πολύ μικρής κοκκοποίησης λίπασμα πλούσιο σε άζωτο και ISODUR®, ιδανικό για ταχύτατα και με μεγάλη διάρκεια αποτελέσματα. Διαλύεται ταχύτατα με ελάχιστα ποτίσματα χωρίς να αφήνει ίχνη. Κατάλληλο για συντηρήσεις σε χλοοτάπητες υψηλών απαιτήσεων όπως αθλητικά στάδια, γήπεδα γκολφ, ιδιωτικά έργα. Προτείνεται για ανοιξιότικη και φθινοπωρινή εφαρμογή και μόνο επιφανειακά. Διάρκεια δράσης έως 4 μήνες.

**ΔΟΣΕΙΣ:** 20-40 gr / m<sup>2</sup> / εφαρμογή

EXPERTS  
FOR GROWTH



# Basacote® Plus

## Περικαλυμμένα Λιπάσματα

Τα BASACOTE PLUS® είναι λιπάσματα περικαλυμμένα, ελεγχόμενης αποδέσμευσης.

Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη βασική λίπανση με ενσωμάτωση στο εδαφικό υπόστρωμα. Ανάλογα με τον τύπο τους αποδίδουν στα φυτά τα θρεπτικά στοιχεία σε διάστημα από 3 έως 12 μήνες.

Ευρύτατη εφαρμογή στα κηποτεχνικά, ανθοκομικά και καρποφόρα φυτώρια.





**Basacote® Plus 3M 16-8-12+2+IXN**

**Σύνθεση:** 16% συνολικό άζωτο (7,4% νιτρικό και 8,6% αμμωνιακό), 8% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 12% K<sub>2</sub>O, 2% MgO, 5% S.  
Ιχνοστοιχεία : 0,02% B, 0,05% Cu, 0,4% Fe, 0,06% Mn, 0,015% Mo 0,02% Zn, **Μέγεθος κόκκου:** 2,5- 3,5 mm

**Ενσωματωμένο στο υπόστρωμα για καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου. Διάρκεια δράσης έως 3 μήνες.**

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Καλοκαίρι σε δόση 1-2 κιλά ανά κυβικό χώματος. Χειμώνας σε δόση 2-3 κιλά ανά κυβικό χώματος.



**Basacote® Plus 6M 16-8-12+2+IXN**

**Σύνθεση:** 16% συνολικό άζωτο (7,4% νιτρικό και 8,6% αμμωνιακό), 8% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 12% K<sub>2</sub>O, 2% MgO, 5% S.  
Ιχνοστοιχεία : 0,02% B, 0,05% Cu, 0,4% Fe, 0,06% Mn, 0,015% Mo 0,02% Zn, **Μέγεθος κόκκου:** 2,5- 3,5 mm

**Ενσωματωμένο στο υπόστρωμα για καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου. Διάρκεια δράσης έως 6 μήνες.**

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Καλοκαίρι σε δόση 2-3 κιλά ανά κυβικό χώματος. Χειμώνας σε δόση 3-4 κιλά ανά κυβικό χώματος.



**Basacote® Plus 9M 16-8-12+2+IXN**

**Σύνθεση:** 16% συνολικό άζωτο (7,4% νιτρικό και 8,6% αμμωνιακό), 8% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 12% K<sub>2</sub>O, 2% MgO, 5% S.  
Ιχνοστοιχεία : 0,02% B, 0,05% Cu, 0,4% Fe, 0,06% Mn, 0,015% Mo 0,02% Zn, **Μέγεθος κόκκου:** 2,5- 3,5 mm

**Ενσωματωμένο στο υπόστρωμα για καλλιέργειες μέσου-μεγάλου βιολογικού κύκλου. Διάρκεια δράσης έως 9 μήνες.**

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Καλοκαίρι σε δόση 3-5 κιλά ανά κυβικό χώματος. Χειμώνας σε δόση 4-6 κιλά ανά κυβικό χώματος.



**Basacote® Plus 12M 15-8-12+2+IXN**

**Σύνθεση:** 15% συνολικό άζωτο (7,4% νιτρικό και 8,6% αμμωνιακό), 8% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 12% K<sub>2</sub>O, 2% MgO, 5% S.  
Ιχνοστοιχεία : 0,02% B, 0,05% Cu, 0,4% Fe, 0,06% Mn, 0,015% Mo 0,02% Zn, **Μέγεθος κόκκου:** 2,5- 3,5 mm

**Ενσωματωμένο στο υπόστρωμα για καλλιέργειες μεγάλου βιολογικού κύκλου. Διάρκεια δράσης έως 12 μήνες.**

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Καλοκαίρι σε δόση 3-5 κιλά ανά κυβικό χώματος. Χειμώνας σε δόση 4-6 κιλά ανά κυβικό χώματος.



# Terraplant® 1

## Φυτοχώματα

Μίγμα εμπλουτισμένης τύρφης σε αναλογία 50% ξανθιά και 50% μαύρη.

Πλήρως απολυμασμένη.



pH: 5,5-6,5

Υγρασία≈65%

I.A.K (meg/100g) 110-130



# Η Compo στην Ελλάδα



## ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Αιγιάλειας 54,  
151 25 Μαρούσι  
Τηλ. 211 1769100,



## ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

80ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου,  
201 00 Ισθμός  
Τηλ. 27410 80638,  
Fax. 27410 80638



## ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τηλ. 211 1769114,  
Fax. 211 1769151



## ΑΠΟΘΗΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ,  
570 22 Θεσ/νίκη



## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Γάννης Κοτσοβός  
Τηλ. 211 1769 110



## ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Σπύρος Παλαιοχωρινός  
Κιν. 6970.154669

Θεόδωρος Χρυσόχου  
Κιν. 6937.249814

Μιχάλης Αργυρόπουλος  
Κιν. 6980.134377

Τάσος Λόντος  
Κιν. 6936.058117

Αλέξανδρος Παπασωτηρίου  
Κιν. 6940.269419

Κώστας Ωραιόπουλος  
Κιν. 6945.926877